

# Χαμηλότερος ο κίνδυνος για μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα και θνησιμότητα μετά από εγχείρηση για υπερθυρεοειδισμό

[iatronet.gr/article/123515/hamhloteros-o-kindynos-gia-meizona-anepithymhta-kardiaggeiakasymvantakai-thnhsimothta-meta-apo-egheirhsh-gia-yperthyreooidismo](https://www.iatronet.gr/article/123515/hamhloteros-o-kindynos-gia-meizona-anepithymhta-kardiaggeiakasymvantakai-thnhsimothta-meta-apo-egheirhsh-gia-yperthyreooidismo)

Εύη Ψωμιάδου

13 Μαρτίου 2024

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, 18:58

## Εύη Ψωμιάδου

Υπεύθυνη Ύλης

Σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα υπερθυρεοειδισμό, η εγχείρηση συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα και θνησιμότητα από όλα τα αίτια, έδειξε νέα έρευνα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Η Carol Chiung-Hui Peng, του Boston University Chobanian and Avedisian School of Medicine, πραγματοποίησε έρευνα με ασθενείς 20 ετών και άνω που διαγνώστηκαν με υπερθυρεοειδισμό μεταξύ 2011 και 2020. Ο κίνδυνος για μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα (και θνησιμότητα από όλα τα αίτια ήταν συγκρίσιμος με αυτών που αντιμετωπίστηκαν με αντιθυρεοειδικά φάρμακα, ραδιενεργό ιώδιο ή εγχείρηση.

Από τους 114. 062 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα υπερθυρεοειδισμό, 93.9%, 1.1%, και 5.1% έλαβαν μόνο ATD, RAI, και εγχείρηση αντίστοιχα σε διάστημα 4,4 ετων.

Σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν ATD όσοι υποβλήθηκαν σε εγχείρηση είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα και θνησιμότητα από όλα τα αίτια, καρδιακή ανεπάρκεια και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά.

Η RAI συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο για μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα σε σύγκριση με τα ATD.

Οι ομάδες δεν είχαν σημαντική διαφορά στον κίνδυνο για οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό.

Τα ευρήματα θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή, καθώς πρόκειται για έρευνα παρατήρησης και δεν αποδεικνύει αιτιατή σχέση.

## Πηγές:

JAMA Network Open.

## Ειδήσεις υγείας σήμερα

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών της Αττικής - Αντιδρούν στα απογευματινά χειρουργεία

Το πρόγραμμα για τα απογευματινά χειρουργεία σε 4 νοσοκομεία της Αττικής [πίνακας]

Σφίγγουν τα λουριά στο ΙΦΕΤ

# Εξέταση αίματος ανιχνεύει τον καρκίνο του εντέρου σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα

iatropedia.gr/ygeia/eksetasi-aimatos-anichnevei-ton-karkino-tou-enterou-se-astheneis-choris-symptomata/181775

Ρούλα Τσουλέα

14 Μαρτίου 2024

Ρούλα Τσουλέα

14 Μαρτίου 2024 | 09:47

Η εξέταση κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση από τον οργανισμό φαρμάκων της χώρας.

Μία εξέταση αίματος ανιχνεύει με μεγάλη ακρίβεια τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε ανθρώπους χωρίς συμπτώματα και χωρίς αυξημένο κίνδυνο να τον αναπτύξουν, αναφέρουν επιστήμονες από ΗΠΑ και Καναδά.

Η εξέταση εντοπίζει θραύσματα του γενετικού υλικού που απελευθερώνουν στο αίμα (ctDNA) τα καρκινικά κύτταρα και οι προχωρημένοι προκαρκινικοί όγκοι. Οι ερευνητές την δοκίμασαν σε χιλιάδες εθελοντές, διαπιστώνοντας ότι ανιχνεύει τη νόσο με ακρίβεια 83%. Ωστόσο η αποτελεσματικότητά της στους προκαρκινικούς όγκους ήταν μειωμένη.

**Αν και κυκλοφορεί ήδη στις ΗΠΑ**, δεν έχει ακόμα λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA) της χώρας. Η απόφαση της FDA αναμένεται εντός του έτους.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος συχνότερος στους ενήλικες (προηγούνται οι καρκίνοι μαστού και πνεύμονος). Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει περισσότερο από το 90% των θανάτων εξαιτίας του. Ωστόσο περισσότεροι από ένας στους τρεις ενήλικες που θα έπρεπε να κάνουν προληπτική εξέταση με κολonosκόπηση, δεν υποβάλλονται σε αυτήν.

Η ανάπτυξη μιας απλής εξέτασης αίματος, θα μπορούσε να αυξήσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο, λένε οι ερευνητές.

## Η νέα μελέτη

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση **New England Journal of Medicine**. Στη μελέτη εντάχθηκαν 7.861 εθελοντές, ηλικίας 45-84 ετών. Όλοι τους υποβλήθηκαν σε κολonosκόπηση και στην εξέταση αίματος, για να συγκριθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Με την ανάλυση αίματος ανιχνεύθηκε με ακρίβεια το 83,1% των καρκίνων που εντόπισε η κολonosκόπηση. Ωστόσο στο 16,9% η κολonosκόπηση αποκάλυψε έναν καρκίνο του παχέος εντέρου και η εξέταση όχι.

Η ανάλυση αίματος ήταν πολύ πιο ακριβής στους καρκίνους του παχέος εντέρου, ακόμα κι αν ήταν αρχικού σταδίου. Αντιθέτως, είχε πολύ μικρότερη ευαισθησία (13,2%) στις προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν εν καιρώ να εξελιχθούν σε

καρκίνο.

«Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η ανάλυση αίματος είναι εξίσου αποτελεσματική με άλλα διαγνωστικά εργαλεία, όπως η εξέταση κοπράνων. Είναι, όμως, υποδεέστερη από την κολonosκόπηση, η οποία θεωρείται η πιο ακριβής διαγνωστική μέθοδος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου», δήλωσε ο **επιβλέπων ερευνητής Dr. William M. Grady**, από το φημισμένο Κέντρο Καρκίνου Fred Hutchinson, στο Σιάτλ.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αυξάνεται ραγδαία, ιδίως στους νέους (ηλικίες κάτω των 50 ετών). Πλέον οι γιατροί βλέπουν ακόμα και 30χρονους που πάσχουν από αυτόν.

**Φωτογραφία: iStock**

Tags: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

[Click Here](#)

Χωρίς γραμμή, χωρίς ανησυχίες: Internet για συνταξιούχους με τιμές στον πάτο! Internet στο σπίτι χωρίς σταθερό

Εξερευνήστε προσιτές επιλογές για πέργκολα αλουμινίου Pergola | Search Ads

Με αυτό το κόλπο το αμάξι σου θα λάμπει από τις γρατζουνιές! ScratchGuard Spray